

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## Δελτίο Ν°8

### ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ






**Ευδερμίδα:** Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης), κάτω Μεσσαρά. Έναρξη πτήσης.

**Περουόσπορος - Ωίδιο:** Καιρική αστάθεια. Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης.


**Τζιτζικάκι:** Αποφυγή επεμβάσεων. Έλεγχοι.

**Θρίπες - Πλανόκοκκος:** Επιτραπέζια σταφύλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

**Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα**

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiohini					
		Στάδιο Η Μούρο	Στάδιο Η - Ι Μούρο -Έναρξη άνθησης	Στάδιο Ι Άνθηση	Στάδιο J Καρπόδεση	Στάδιο Κ Ράγες σε ανάπτυξη
<b>Πρώιμη ζώνη</b>					<b>Από J έως Κ, κυρίαρχο το J</b>	
<b>Μεσοπρώιμη</b>				<b>Από I έως J</b>		
<b>Οψιμη ζώνη</b>		<b>Από Η έως Ι, κυρίαρχο το Η</b>				

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ:**  
(*Lobesia botrana*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Τις τελευταίες μέρες, σταδιακά καταγράφεται δραστηριότητα (αυξανόμενοι πληθυσμοί- αραιές ωτοκίες) στις περιοχές που ακολουθούν την πρόιμη ζώνη.

**Οδηγίες :**

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

**- Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ της πρόιμης και μεσοπρόιμης ζώνης) :**

- Επιτραπέζια : 26 - 27 Μαΐου
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 29 - 30 Μαΐου

**- Κάτω Μεσσαρά :**

- Επιτραπέζια : 27 - 28 Μαΐου
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 29 - 31 Μαΐου

**Επισημάνση.** Επειδή από αμπέλι σε αμπέλι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την επιδεκτικότητα των ρωγών, σε σουλτανίνες που βρίσκονται ακόμα στα στάδια τέλος άνθησης - καρπόδεση η καταπολέμηση μπορεί να γίνει 1-2 μέρες μετά.

**Σημείωση.** Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρόιμες και όψιμες περιοχές καθώς και στο νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**  
(*Plasmopara viticola*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Η καιρική αστάθεια και η ευαισθησία των βλαστικών σταδίων διατηρούν ενεργό το παθογόνο και τον κίνδυνο νέων μολύνσεων.

**Οδηγίες :**

- Χρειάζεται συστηματικός έλεγχος των αμπελιών.  
- Σε αμπέλια - περιοχές που υπάρχουν ή εμφανίζονται συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να γίνεται συστηματική καταπολέμηση με διασυστηματικά ή διειδοδυτικά σκευάσματα.  
Επόμενες βροχές ή περίοδοι με έντονες δροσιές, πρέπει να τα βρίσκουν καλυμμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

**ΩΙΔΙΟ:**  
(*Erysiphe necator*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Διαπιστώνονται δευτερογενείς μολύνσεις σε όλες τις ζώνες.  
- Ο μύκητας αναπαράγει συνεχώς μολύσματα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (μούρο - άνθηση - καρπόδεση - νεαρές ρώγες) είναι ευαίσθητα στις προσβολές.

**Οδηγίες :**

- Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα το σκεύασμα).  
- Η καιρική αστάθεια που επικρατεί δυσκολεύει την εφαρμογή του θειαφιού σε σκόνη (απύρι) που έχει καλή δράση σε συνθήκες ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες 18-25°C, χαμηλής υγρασίας και χωρίς βροχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

**ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:**  
(*Empoasca spp*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Προς το παρόν καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί (κάτω από το όριο επιζημιότητας).

**Οδηγίες :**

- Να μη γίνονται προληπτικές επεμβάσεις. Είναι άσκοπες και προκαλούν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Επιπλέον ενθαρρύνεται η ενεργοποίηση μηχανισμών ανθεκτικότητας.

- Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι (όριο επέμβασης 50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, στην κάτω πλευρά τους).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

**ΘΡΙΠΕΣ:**  
(*Thripidae*)

**ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:**  
(*Planococcus ficus*)

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Υπενθυμίζεται ότι οι θρίπες και ο πλανόκοκκος αφορούν τα επιτραπέζια σταφύλια.

**Οδηγίες :**

- Απαραίτητοι οι έλεγχοι στα επιτραπέζια σταφύλια. Μόνο όπου διαπιστωθούν επιζήμιοι πληθυσμοί τους δικαιολογείται καταπολέμηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους [θρίπες πατήστε εδώ](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [πλανόκοκκο πατήστε εδώ](#)

**Φάρμακα :**

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 25 Μαΐου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

α/α

Οικονομάκη Ροζάνα